

Kruidbeheersingsschema appel & peer 2026

E-mail: info@pcfruit.be Web: www.pcfruit.be

	TIJDSTIP	OPMERKING	Actieve stof	Handelsnaam	Liter/ha vollevelds	Groeijaar			Opmerkingen
						1°	2°	3°	
	Winter	Bodemherbicide	isoxaben	AZ 500	0,5-1	●	●	●	Max. 1x per jaar. December-begin maart Max. 30% van de oppervlakte, naakte grond in combinatie met Kerb (grassen) Brandnetels, dovenetels, ereprijs, kamille, kruiskruid
		Bodemherbicide	chloortoluron	Aako chlortoluron 500 SC, Lentipur 500 SC, Chloortoluron 500 SC, Tolurex SC	3-4		●	●	In combinatie met middel tegen straatgras in vooropkomst (Stomp Aqua), bij aanwezigheid grassen glyfosaat. Opletten: hoge wateroplosbaarheid. Bufferzone 5 m
			pendimethalin 455 g/l	Stomp Aqua	2-4		●	●	In combinatie met één van de andere bodemherbiciden. Max. 1 x per jaar, bufferzone 10 m Tegen amarant, ereprijs, melganzevoet, veelknopigen, vogelmuur. Niet tegen kruiskruid. Max. 2 kg actieve stof per jaar. Bufferzone Stomp Aqua 20 m
	Voorbloei	Breedwerkende contact herbicide (systemisch)	glyfosaat 360 g/l 450 g/l	Diverse	2-4 1,6-3,2			●	Vanaf 2de groeijaar enkel bij goed groeiende bomen. Max. 1x/jaar. Bufferzone 1-5 m, driftreductie 75-90%, afhankelijk van handelsproduct. Max. 1440 g actieve stof glyfosaat/ha/jaar of 576 g actieve stof glyfosaat/ha strook/jaar bij 40% zwartstrook.
	Bloei	Geen herbiciden toepassen							
	Nabloei & zomer	Breedwerkende contact herbicide (systemisch)	glyfosaat 360 g/l 450 g/l	Diverse	2-4 1,6-3,2			●	Vanaf 2de groeijaar enkel bij goed groeiende bomen. Max. 1x/jaar. Bufferzone 1-5 m, driftreductie 75-90%, afhankelijk van handelsproduct. Max. 1440 g actieve stof glyfosaat/ha/jaar of 576 g actieve stof glyfosaat/ha strook/jaar bij 40% zwartstrook.
		Grassenmiddelen (systemisch)	fluazifop-p-butyl	Fusilade Max	3	●	●	●	Tegen grassen, behalve straatgras. Max. 1 x per jaar. Niet mengen met groeistoffen. Eerst grassenmiddel toepassen, gevolgd door groeistoffen na 2d.
			propaquizafop	Agil	0,75-1	●	●	●	Tegen grassen behalve straatgras, kweekgras. Max. 1 x per jaar, bomen niet raken. Niet mengen met groeistoffen. Eerst grassenmiddel toepassen, gevolgd door groeistoffen na 2d.
		Groeistoffen (systemisch)	MCPA 750 g/l	Agroxyl 750, U46 M750, U46M	2-4	●	●	●	U46 M750: Bufferzone 2 m Max. 1 x per jaar. Niet toepassen bij hoge temperaturen, RV >90% of <65%, en tijdens de bloei. Toepassen met lage druk, grove druppel en beschermkap. Gevaar bij regen na toepassing op droge grond.
			MCPA + MCPP-p + DP-p	Gramix Super, Duplosan Super	2,3-2,6	●	●	●	MCPA 750 g/l is effectiever bij zware druk wortelonkruiden (paardenbloem, distels)
		Al dan niet in combinatie met volgend bodemherbicide (tot 15/06)							
		Bodemherbicide	diflufenican	Diflanil 500 SC	0,6		●	●	Bufferzone 20 m en 90% driftreductie. Tegen bingelkruid, klein kruiskruid, straatgras Best combineren met één van de andere bodemherbiciden
	Najaar	Breedwerkende contact herbicide (systemisch)	glyfosaat 360 g/l 450 g/l	Diverse	2-4 1,6-3,2			●	Vanaf 2de groeijaar enkel bij goed groeiende bomen. Max. 1x/jaar. Bufferzone 1-5 m, driftreductie 75-90%, afhankelijk van handelsproduct. Max. 1440 g actieve stof glyfosaat/ha/jaar of 576 g actieve stof glyfosaat/ha strook/jaar bij 40% zwartstrook. Kan naoogst maar bij voorkeur niet meer toepassen na 15 juli omwille van risico op gewasschade, oppassen om zeker geen groene delen te raken!
		Bodemherbiciden	propyzamide	Kerb 400, diverse	3,1	●	●	●	Max. 1 x per jaar. Van november tot en met februari, bij koud weer. < 10°C Straatgras, kweek, kleine brandnetel, duizendknopen, vogelmuur

Voor onkruidspuiten minimale bufferzone van 1 m, maximum 4 herbiciden behandelingen per jaar. Groeistoffen met afschermkap toepassen.

* pcfruit vzw-ST@F stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van deze gegevens. Dit onkruidschema is louter een advies! (Toestand januari 2026)

* dosis uitgedrukt in liter per hectare vollevelds, voor de hoeveelheid per hectare op strook dient u de dosering te vermenigvuldigen met het % van de oppervlakte dat zwartstrook is.

* Een zwartstrook van slechts 20% van de volleveldsoppervlakte zorgt voor minder herbiciden gebruik, zonder productieverlies. zorg dat overgang van de grasstrook naar de smallere grasstrook telkens goed wordt afgemaaid door de bredere of brede afgestelde maaier.

● Aanduiding vanaf welk groeijaar de vermelde herbiciden kunnen toegepast worden bij jonge bomen.

Mechanisch kruidbeheersingsschema appel & peer 2026

E-mail: info@pcfruit.be Web: www.pcfruit.be

Verantwoordelijke uitgever
 pcfruit vzw, Dany Bylemans
 Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden

	TIJDSTIP	100% mechanisch	Combi chemie & mechanisch	Doel mechanische kruidbeheersing	Doel chemische kruidbeheersing
	Winter	Geen grondbewerking	Isoxaben: AZ 500 0,5-1 l/ha volleveld	Bodem meestal te nat voor bodembewerkingen	Max. 1x per jaar. December-begin maart Max. 30% van de oppervlakte, naakte grond in combinatie met Kerb Brandnetels, dovenetels, ereprijs, kamille, kruiskruid
	Voorjaar (tot 1-2 weken voor bloei)	Afaarden en/of Schoffelen	Glyfosaat 360 g/l 2-4 l/ha volleveld Glyfosaat 450 g/l 1,6-3,2 l/ha volleveld	- Afaarden nodig om opnieuw een vlakke boomstrook te creëren - Aanwezige onkruiden onderwerken - Minder concurrentie voor meststoffen - Zwarte strook voor warmte uitstraling tegen lentenachtvorst - Extra mineralisatie: meer N beschikbaar voor het gewas - Onderwerken uitgevoerde bemesting zodat deze sneller werkt	Vanaf 2de groeijaar enkel bij goed groeiende bomen. Max. 1x/jaar. Bufferzone 1-5 m, driftreductie 75-90%, afhankelijk van handelsproduct. Max. 1440 g actieve stof glyfosaat/ha/jaar of 576 g actieve stof glyfosaat/ha strook/jaar bij 40% zwartstrook.
	Bloei	Geen grondbewerking	Geen herbiciden/ grondbewerking	Vers bewerkte grond houdt minder goed warmte vast tegen lentedenachtvorst.	
	Nabloei tot juni	Schoffelen	Schoffelen En/of Zwenkmaaïen/ litsenmaaïen	Opgelet: in mei migratie van oorwormen naar de boom. In deze periode frequente grondbewerking vermijden. De cyclus van de oorwormen is op te volgen via het nuttigen model online.	
	Zomer (vanaf eind juni)	Zwenkmaaïen / Litsenmaaïen	Zwenkmaaïen / Litsenmaaïen	- Vanaf langste dag van het jaar - Geen extra N-piek forceren - Geen opspattende modder op de laaghangende vruchten —> minder kans op schimmelinfecties (<i>Phytophthora</i>)	
	Najaar	Zwenk-/litsenmaaïen en/of Schoffelen en/of Aanaarden	Zwenk-/litsenmaaïen en/of Schoffelen en/of Propizamide: Kerb 400 3,1 l/ha volleveld	- Bij hoge kruiden na oogst kan er eerst gemaaid worden (litsenmaaier of zwenkmaaier). Dit helpt ook voor bladversnippering na bladval. - Opgelet: eileg van oorwormen vindt plaats voor en/of na de winter. Overmatige grondbewerkingen kunnen de nesten met eieren of larven mogelijk vernietigen - Door aanaarden wordt de graszode gekeerd en grassen bestreden. Ook worden bladeren zo sneller verteerd.	- Max. 1 x per jaar. Van november tot en met februari, bij koud weer. < 10°C - Straatgras, kweek, kleine brandnetel, duizendknopen, vogelmuur



Schijveneg voor afaarden



Schijveneg voor aanaarden



Rolhakken



Vingerwieder



Rijenfrees



Litsenmaaier



Zwenkmaaier

* Opmerking: **Jonge bomen** (eerste 3 jaar): zorgen voor kruidvrije strook om groeistart te bevorderen. Hierbij oppassen bij het gebruik van litsenmaaïers. Deze kunnen schade aan de schors veroorzaken, wat ingangspoorten kunnen zijn voor kankers, bloedluis, appelglasvlinder.

* Voor bodembewerkingen rekening houden met minimale teeltvrije zone van **1 m** langs waterlopen, op de teeltvrije zone mag geen bodembewerking uitgevoerd worden.

* pcfruit vzw-ST@F stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van deze gegevens. Dit kruidschema is louter een advies! (Toestand januari 2026)

* Afbeeldingen: Hochschule Weihenstephan Triesdorf