

NATYRA® / SQ159 / MAGIC STAR®



Kruising: Elise x schurftresistente selectie
Oorsprong: WUR - Nederland

Natya ® is de naam voor de biologische teelt
Dit ras in IPM geteeld voor Colruyt, wordt verkocht onder de merknaam Magic Star®

Vruchteigenschappen

- Natya is een harde en zoete appel met een matige vruchtmaat.
- Bij de pluk zit de hardheid rond 8 kg/cm² en deze blijft vrij goed behouden.
- Het suikergehalte zit vaak boven 14 °Brix.
- De houdbaarheid en het uitstalleven zijn zeer goed.
- De appels hebben een donkerrode, gestreepte bloos.
- Het pluktijdstip valt in de 2^{de} helft van oktober, vergelijkbaar met Braeburn
- Overplukken is noodzakelijk.
- De appels kunnen minstens 3 maanden in gewone koeling bewaard worden.

Ziektegevoeligheid

	Gevoeligheidsgraad
Schurft	resistent*
Witziekte	matig gevoelig
Kanker	zeer gevoelig
Bacterievuur	gevoelig
Bloedluis	gevoelig
Zonnebrand	licht gevoelig

* In Nederland is de Vf-resistentie van Natya doorbroken.

In 2017 kwamen er vooral op vruchten van IPM-percelen kleine zwarte vlekjes voor. Hieruit kon geen schimmel geïsoleerd worden. De oorsprong is vermoedelijk fysiologisch, maar op dit ogenblik is de precieze oorzaak nog niet gekend.

In 2018 en 2019 waren er ook op appels in de biologische teelt met gelijkaardige problemen. Stilaan rijst het vermoeden dat dit een gevolg is van verbranding van de lenticellen door een bepaalde bespuiting.

Oppassen met bespuitingen met zwavel in de zomer. Bij hoge temperaturen kan dit, zelfs bij een ruim interval tussen de behandeling en de hittegolf, voor bladverbranding zorgen.

Planten & Opkweek

- Natyra heeft een zwakke groei. Vandaar dat er op maximaal 1 m geplant moet worden.
- Door de kortere plantafstand moet er ook korter gesnoeid worden, wat zeker een voordeel is naar vruchtmaat.
- Bij de snoei moet er vooral prikkelend gesnoeid worden.
- De bomen mogen in de eerste jaren ook niet te vol hangen zodat ze volume kunnen maken.
- Irrigatie is bij dit ras zeker een aanwinst om de bomen voldoende vitaal te houden. Dit zal ook de vruchtmaat ten goede komen.



Foto 2: 6-jarige bomen van Natyra

- Indien het kan, wordt Natyra best op verse grond geplant. Indien het toch om een herinplantperceel gaat, laat men dit perceel best een jaar liggen en zaait men een groenbemester (bv. Japanse haver of Tagetes) in. Op het eind van het seizoen kan men deze dan onderwerken voor extra organisch materiaal. Daarnaast kan men zowel voor het zaaien van de groenbemester als voor het planten stalmest of champignonmest inwerken. Dit zal de bodemstructuur verbeteren, waardoor de bomen een betere start kennen.
- Om de bomen een goede start te geven bij het planten, kan het helpen om bij het planten een bodemverbeteraar in het plantgat te mengen. Vivisol en Terra Fertil aan 250 gram/boom geven in de proeven goede resultaten en zijn zowel in IPM als Bio toegestaan. Hier bovenop kan men nog 10 ml/boom Pt-mix aangeven.

- Het gebruik van Mycorrhiza's die in de handel zijn, hebben tot hiertoe geen effect gehad op de groei, zeker niet in bestaande aanplanten.
- Er zijn ook heel wat andere groeibevorderende preparaten op de markt. Ook deze hebben tot hiertoe in proeven niet het gewenste resultaat getoond.
- Oppassen met groeischokken op jonge bomen. Dit kan bij Natyra aanleiding geven tot ruwschilligheid en barstjes rond de neus. In de gangbare teelt kan men 1 of 2 bespuitingen met GA4/7 uitvoeren kort na de bloei om dit op te vangen. In de biologische teelt is er niets dat dit probleem kan verkleinen.

Bestuiving

- De S-allelen van Natyra zijn S3S9 en het is een middentijdse bloeier. Als siermalus wordt op dit ogenblik een combinatie aangeraden van Red Sentinel met Malus Everest en/of Prof. Sprenger.
- Voor de biologische telers kunnen ook Topaz, Pinova of Santana als bestuiver gebruikt worden.

Vruchtdunning

- Natyra zal in de meeste jaren toch gedund moeten worden. Binnen de biologische teelt kan dit enkel via bloemverbranding met kalkzwavel. In 2020 leidde dit wel tot netvormige verruwing op de vruchten.
- Volgens bepaalde studies zou Karma ook als bloemdunner gebruikt kunnen worden. De eerste proeven van 2020 tonen echter aan dat dit middel enorm veel verruwing gaf.



Foto 3: netvormige verruwing na het gebruik van Curatio als bloemdunner




Foto 4: sterke vruchtverruwing na het gebruik van Karma als bloemdunner

- Voor de IPM-telers zijn er meer mogelijkheden, maar ook deze zijn nog niet getest bij Natyra.

Bemesting

Voor de bemesting moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de biologische en de geïntegreerde teelt.

Biologische teelt

- Voor de biologische teelt is het meest aangewezen om een 2-tal keer een fractie van 30 à 40 E N via bloedmeel te geven in het voorjaar. Een andere N-meststof waarmee heel goede resultaten worden behaald is Fontana 9 % N.
- Ook in het 2^{de} groeijjaar is een gefractioneerde bemesting met bloedmeel gewenst.
- Wanneer de bomen ouder worden en voldoende vitaal zijn, gaan we naar 1 gift in het voorjaar (maand voor de bloei). Bij zwakke groei blijft een gefractioneerde N-bemesting aangewezen.
- Natyra is gevoelig voor magnesiumgebrek. Het gebruik van kieseriet is aangewezen.

Geïntegreerde teelt

- In de eerste 2 groeijaren adviseren we een gefractioneerde bemesting van 2 x 20 E N o.v.v. met ammoniumnitraat.
- Wanneer de bomen ouder worden, schakelen we over naar 1 gift van 30 à 40 E N o.v.v. kalknitraat voor de bloei.
- Indien de bomen toch te zwak groeien, is het niet aangewezen om in de zomer extra N te geven, want dit kan de kleuring negatief beïnvloeden.
- Natyra is gevoelig voor magnesiumgebrek. Voorzie een aantal bladbespuitingen met bitterzout in de loop van het seizoen.
- Mogelijks zijn de fysiologische problemen in bewaring een gevolg van Ca-gebrek. Verzorg de bekalking en bouw vanaf einde bloei een aantal Ca-bladvoedingen in het spuitschema.
- Pas anderzijds ook op met veel mengingen van bladvoedingen, zeker bij warm weer, want ook dit kan aanleiding geven tot verbranding.